LISTE DES VACCINS POUR LES USA

Vaccins obligatoires :

VACCIN	NOMBRE DE DOSES *(si plusieurs)*	À SAVOIR
Hépatite A	2	6 mois d'intervalle entre chaque dose. Vaccin fortement conseillé car obligatoire dans de nombreux états.
Hépatite B	3	La 2ème dose doit être au moins 1 mois après la 1 dose, la 3ème dose doit être au moins 4 à 6 mois après la première dose avec une intervalle de 8 semaines entre les doses 2 et 3.
Coqueluche	4	La dernière dose doit avoir lieu dans les 10 ans suivant la date de fin du programme.
TBC / BCG TEST		Vous devez présenter un test cutané de Mantoux négatif ; ou résultat négatif du test sanguin TBC ; ou une radiographie pulmonaire négative. Si un test cutané de Mantoux donne un résultat positif, une radiographie pulmonaire est nécessaire.
DTP		La dernière dose doit dater des 10 dernières années
Méningite	1	Certaines écoles en exigent 1 dose supplémentaire après l'âge de 16 ans. Vaccin contre les quatre souches (ACWY).
Rougeole	2	
Varicelle	2	La date de la maladie (mois/année) sera également prise en compte.
Polio	3	La dernière dose doit avoir eu lieu après l'âge de 4 ans.

Vaccins conseillés :

→ Tuberculose
→ Papillomavirus
→ Typhoïde
→ Rage